Continue

إرشادات إصلاح الفتق البطنية

هدها توضع رُقعة شبكية لدعم المنطقة الضعيفة تحت الصفاق، ثم يتم تدبيس الصفاق أو خياطته. وبعد انتهاء العملية، تُغلق الشقوق الصغيرة في البطن بغرزة واحدة أو اثنتين أو بشريط جراحي لاصق. وفي غضون بضعة أشهر، تختفي الشقوق بشكل كامل تقريبًا. ما هي فوائد جراحة إصلاح الفتق بالتنظير؟ ثلاث تُدبات صغيرة بدلًا من شق جراحي كبير 2017

ل ما يجب توقعه في الأيام والأسابيع التي تسبق العملية: الاستشارة والتشخيص: تبدأ رحلتك باستشارة شاملة مع جراح. سيقوم بتقييم حالتك، ومناقشة أفضل الخيارات الجراحية، وشرح الإجراء. قد يُطلب إجراء فحوصات تشخيصية، مثل التصوير المقطعي، لتقييم حجم الفتق وموقعه. تعليمات ما قبل الجراحة: سيقدم لك الجرّاح تعليمات مُحددة، تشمل القيود الغذائية، وتعديلات الأدوية، ومتطلبات الصيام. من الضروري اتباع هذه الإرشادات بدقة لضمان سير العملية الجراحية بسلاسة. الاختبار قبل الجراحة: قد تحتاج إلى إجراء فحوصات دم، أو تخطيط كهربية القلب، أو تقييمات أخرى للتأكد من سلامتك قبل الجراحة. يساعد هذا في تحديد أي مخاطر محتملة، ويمكن الفريق الطبي من التخطيط وفقًا لذلك. الاستعداد

رافب أي علامات عدوى، مثل الاحمرار أو التورم أو الإفرازات غير الطبيعية. قيود النشاط: تجنب رفع الأثقال والأنشطة الشاقة لبضعة أسابيع للسماح لجسمك بالتعافي. أسئلة أنشطتك الطبيعية: ستبلغ بموعد المتابعة المجدولة لضمان تعافيك. سيتابع طبيبك تقدمك، ويزيل أي غرز جراحية إذا لزم الأمر، ويعالج أي مخاوف لديك. التعافي على المدى الطويل: يستطيع معظم المرضى العودة إلى ممارسة الأنشطة الخفيفة خلال بضعة أسابيع، وممارسة كامل نشاطهم خلال بضعة أشهر. اتبع توصيات طبيبك لضمان تعافي ناجح وتجنب المضاعفات. جراحات العلاج في مستشفيات كوتينتال تقدم مستشفيات كوتينتال رعاية شاملة لجراحة الفتق، مع التركيز

وزن، هل يمكن إجراء عملية الفتق مع شد البطن؟ نعم، يمكن إجراء عملية شد البطن مع الفتق، حيث يتم شد البطن العلوية والسفلية أثناء الجراحة، ويتم عمل شق حول السرة وشق آخر يمتد إلى جانبي الورك أسفل خط البكيني. يمحرر شد الجلد والأنسجة. يقوم الجراح بإصلاح الفتق ودفع الأحشاء البارزة خلف جدار البطن وتقليل الضغط وعدم الراحة. ما هي شروط إجراء عملية الفتق مع شد البطن؟ لإجراء عملية الفتق السري مع شد البطن، يجب توافر عدد من الشروط الضرورية والهامة، ومن بين هذه الشروط: يجب إجراء العملية على يد جراح ماهر ومؤهل، وممتلك مستوى عالٍ من الخبرة والدقة في

اليوم. متابعة الزيارات اللاحقة: يجب الالتزام بالزيارات اللاحقة للطبيب لمراجعة التحسن وفحص الجرح الجراحي والتأكد من عدم وجود أي مضاعفات. التمارين الرياضية: يجب تجنب ممارسة التمارين الرياضية الشديدة والأنشطة الرياضية المكثفة لمدة 4-6 أسابيع بعد العملية، ويمكن البدء بالتمارين الخفيفة والتدريجية بعد مرور تلك الفترة. يجب الالتزام بتلك النصائح ومتابعة تعليمات الطبيب بعد إجراء عملية فتق السرة وشد البطن لتحقيق أفضل النتائج وتجنب أي مضاعفات محتملة. اقرأ المزيد عن: كل ما يخص نزول الوزن بعد عملية شد البطن وأخيرًا، تأمل أننا قد وفقنا في توفير كافة المعلومات اللازمة حول عملية الفتاق مع شد البطن، وإذا كانت لديكم أية أسئلة أو استفسارات إضافية، فلا تترددوا في الاتصال

ن عملية فتق البطن عندما يندفع أو يخترق عضو من الداخل عبر جدار البطن. يحدث هذا عادةً في منطقة الأربية أو السرة أو الجزء العلوي من البطن. يمكن أن يسبب الفتق ألمًا وانزعاجًا وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يُعالج. تشمل أنواع الفتق الشائعة الفتق الإربي (inguinal hernia) والفتق السري والفتق الفخذي والفتق الجراحي (incisional hernia) والفتق الحجابي (hiatal hernia). ما هي أعراض الفتق؟ تختلف أعراض الفتق اعتمادًا على نوعه وموقعه. قد يكون الفتق الإربي مؤلمًا بشكل خاص، خاصةً عند السعال أو الانحناء أو رفع الأثقال. قد يكون الفتق السري أقل إيلامًا ولكنه يسبب انتفاخًا ملحوظًا في البطن. قد يؤدي الفتق الحجابي إلى ارتجاع حمض المعدة وعسر الهضم. ما هي أسباب الفتق؟ يحدث الفتق عندما يضعف جدار البطن أو يتمزق، مما يسمح للأنسجة الدهنية أو الأعضاء الداخلية بالبروز من خلال نقطة الضعف. قد يكون هذا الضعف خلقيًا (موجودًا عند الولادة) أو مكتسبًا (يتطور مع مرور الوقت). تشمل العوامل المساهمة في تطور الفتق

ن الجراحة الفتق الإربي بالمنظار Laparoscopic Inguinal Hernia Repair اصلاح الفتق الإربي بالمنظار Laparoscopic Small Bowel Resection علاج انسداد الأمعاء بالمنظار Laparoscopic Small Bowel Resection عملية انسداد الأمعاء الدقيقة بالمنظار Laparoscopic Small Intestine and Appendix Surgery عمليات الأمعاء والزائدة الدودية Laparoscopic Spleen Surgery استئصال الطحال بالمنظار Laparoscopic Gastric Bypass عملية تحويل المسار المعدي Laparoscopic Gastric tumor resection عمليات تحويل المسار Laparoscopic Heller Myotomy for Achalasia استئصال الورم الحميد والخبيثة Laparoscopic Minigastric Bypass (MGB) عملية تحويل المسار المصغر (MGB) Laparoscopic Roux -en Y gastric bypass عملية تحويل المسار الإربي عبر والتكرياس Laparoscopic SADI operation or BPD/DS عمليات إزالة حلقة المعدة Laparoscopic band removal عمليات السمنة التعديلية Laparoscopic Revision surgery

Nissen fundoplication with hiatal hernia اعادة اصلاح الفتق في الحجاب الحاجز Redo-Nissen Fundoplicatiaon عملية انسداد المريء بعد الارتجاع Laparoscopic Spleen Resection عمليات الطحال Laparoscopic Small Intestine and Appendix Surgery عمليات الأمعاء والزائدة الدودية Laparoscopic Gastric Bypass عملية تحويل المسار المعدي Laparoscopic Gastric tumor resection عمليات تحويل المسار Laparoscopic Heller Myotomy for Achalasia استئصال الطحال بالمنظار Laparoscopic Spleen Surgery استئصال الورم الحميد والخبيثة Laparoscopic Small Bowel Resection علاج انسداد الأمعاء بالمنظار Laparoscopic Small Bo

Hemorrhoidectomy عمليات الباسور عن طريق ربط الشريان Haemorrhoidal Artery Ligation - Recto Anal Repair (HAL-RAR) عمليات الشق الشرجي عن طريق البوتكس Left Lateral Sphincterotomy for anal fissure عمليات الشق الشرجي الكلاسيكي Botox injection for anal fissure عمليات الباسور Anal Fistula Surgery كيس الشعر مع خياطة ترميمية Pilonidal Sinus Excision with Limberg Flap عمليات الليزر Hernia Surgery اصلاح فتق الصرة عبر المنظار Laparoscopic Umbilical Hernia Repair اصلاح فتق الصرة عبر شق عادي Open Umbilical Hernia Repair اصلاح الفتق الإربي بالمنظار Laparoscopic Inguinal Hernia Re

Thyroid gland excision استئصال الغدي الدرقي أو الكلي للأورام الحميدة والخبيثة Benign and Cancer Breast Surgery

ن هذه الطريقة التقليدية قيام الجراح بعمل شق قريب من الصرة، وإدخال الأدوات الجراحية والمنظار لإزالة الفتق. بعد الإصلاح، يتم خياطة الأنسجة العضلية وإغلاق الشق. ما هي التقنيات المستخدمة في الجراحة؟ تعتمد التقنية المحددة المستخدمة على الموقع والحجم والخصائص الفردية للفتق. تشمل التقنيات الشائعة: الإصلاح المفتوح: يتضمن إجراء شق كبير في البطن للوصول إلى الفتق وإصلاحه يدويًا. الإصلاح بالمنظار: يتضمن إجراء شقوق صغيرة وإدخال منظار وأدوات جراحية. الإصلاح الروبوتي: يستخدم نظامًا روبوتيًا للتحكم في الأدوات الجراحية بدقة عالية. ما هي المخاطر والمضاعفات المحتملة؟ بشكل عام، إصلاح الفتق آمن ويُعتبر من الإجراءات الروتينية. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي عملية جراحية، هناك بعض المخاطر والمضاعفات المحتملة. تشمل المخاطر الشائعة: الألم: قد يكون هناك ألم وانزعاج في موقع الجراحة بعد العملية. يمكن السيطرة على الألم بسهولة بالأدوية. العدوى: قد تحدث عدوى في موقع الشق الجراحي. يتم وصف المضادات الحيوية للوقاية من العدوى. النزيف: قد يحدث نزيف بسيط أو كبير في موقع الجراحة. يتم السيطرة على النزيف أثناء الجراحة. الانتفاخ: قد يحدث انتفاخ في منطقة الجراحة. الخدر: قد يشعر المريض بخدر في منطقة الجراحة. الانسداد: في حالات نادرة، قد يؤدي الإصلاح إلى انسداد في الأمعاء. ما هي فوائد جراحة إصلاح الفتق بالتنظير؟ تلات تُدبات صغيرة بدلًا من شق جراحي كبير

ن الجراحة الفتق الإربي بالمنظار Laparoscopic Inguinal Hernia Re